

Αντιμυκητιακό ευρέως φάσματος

Αρ. πρωτ.: Υ.Α.Α. & Τ. Moldgard σκόνη: 115148 από 26/09/2013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **Moldgard**® είναι προσθετικό ζωοτροφών με στόχο την προστασία τους από τις επιμόλυνσεις με μύκητες και ζύμες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Το **Moldgard**® παρουσιάζει ευρύ φάσμα δράσης εναντίον των μυκήτων και αδρανοποιεί τις ζύμες που αναπτύσσονται κατά την αποθήκευση των ζωοτροφών σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Το **Moldgard**® είναι ασφαλές χάρη στο ουδέτερο pH του και είναι ανθεκτικό στη μηχανική επεξεργασία.
- Το **Moldgard**® δεν επηρεάζει την γευστικότητα των ζωοτροφών.
- Το **Moldgard**® είναι διαθέσιμο σε στερεή κοκκώδη μορφή και σε υγρή μορφή.

Και οι δύο μορφές χρησιμοποιούνται σε προγράμματα υγιεινής προστασίας των ζώων. Επιπλέον, η υγρή μορφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις απολυμάνσεις των σταβλικών εγκαταστάσεων, καθώς και στην επεξεργασία της στρωμνής των πτηνών.

Απόλυτα συμβατό με τα προγράμματα εκρίζωσης των σαημονεληθώσεων των πτηνών.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Μίγμα καρβοξυλικών οξέων και των αλάτων τους, κατάλληλα επεξεργασμένων με σκοπό τη μέγιστη αντιμυκητιακή δραστηριότητα.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Τα ελεύθερα οργανικά οξέα έχουν ισχυρή αντιβακτηριακή και αντιμυκητιακή δράση. Έχουν την ιδιότητα να διαπερνούν την κυτταρική μεμβράνη των βακτηρίων και των μυκήτων, με αποτέλεσμα τη μεγάλη συγκέντρωση ανιόντων, μέσα στο κυτταρόπληγμα και την αναστολή της σύνθεσης του DNA των μικροβίων και των μυκήτων.

Οι πτηνικές ουσίες που εκλύονται μετά την προσθήκη του **Moldgard**®, εκδηλώνουν την αντιμυκητιακή δράση τους σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ η συνεχής παραγωγή τους εγγυάται την προστασία των ζωοτροφών κατά την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη μεταφορά τους.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Ποσοστό υγρασίας στο σιτηρέσιο (%)	Δόση Moldgard (κιλά/τόνο)
< 15	0,5
15 - 17	1,0
> 17	1,5

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σάκοι των 25 κιλών σε στερεή κοκκώδη μορφή.

Δοχεία των 25, 200, 1000 λίτρων (υγρή μορφή).

MOLDGARD ΣΚΟΝΗ

ΠΡΟΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Αποκλειστικά για την παρασκευή ζωοτροφών

Σύνθεση ανά κιλό:

Προπιονικό οξύ	(E 280) ⁽¹⁾
Προπιονικό αμμώνιο	(E 284) ⁽¹⁾
Μυρμηκικό αμμώνιο	(E 295) ⁽¹⁾
Οξικό οξύ	(E 260) ⁽¹⁾
Σορβικό οξύ	(E 200) ⁽¹⁾
Φορέα μετάλλων	

Οδηγίες Χρήσης:

500 γραμμάρια ανά 1000 κιλά πλήρους ζωοτροφής
με ποσοστό υγρασίας 15%

1000 γραμμάρια ανά 1000 κιλά πλήρους ζωοτροφής
με ποσοστό υγρασίας 15 - 17%

1500 γραμμάρια ανά 1000 κιλά πλήρους ζωοτροφής
με ποσοστό υγρασίας 17%

Δεν υπάρχει υπολειμματική περίοδος

Διάρκεια Ζωής:

24 μήνες μετά την ημερομηνία παρασκευής

⁽¹⁾ E + αριθμός: σημαίνει ότι αυτή η δραστική ουσία έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο των εγκεκριμένων πρόσθετων υλών για ενσωμάτωση στις ζωοτροφές των παραγωγικών ζώων στο χώρο της Ε.Ε. σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 και αριθ. 769/2009

Αρ. Πρωτ. Υ.Α.Α. & Τ.: 115148 από 26/09/2013