

Πρώτη ύλη για όλα τα είδη ζώων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρώτη ύλη με αυξημένη συγκέντρωση σε υψηλής ποιότητας ωμέγα-3 απαραίτητων λιπαρών οξέων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες** – α) βελτιώνει την υγεία, β) βελτιώνει τη γονιμότητα και γ) βοηθά στο να αυξηθεί η γαλακτοπαραγωγή.
- Μικρά μηρυκαστικά** – βελτιώνει: α) τη γονιμότητα και β) τη γαλακτοπαραγωγή.
- Χοίροι** – βελτιώνει: α) τη γονιμότητα των χοιρομητέρων και των κάπρων, β) το ανοσοποιητικό σύστημα και γ) τον ρυθμό ανάπτυξης των χοίρων που βρίσκονται στη φάση της προπάχυνσης και της πάχυνσης.
- Πτηνά** – βελτιώνει: α) τον ρυθμό ανάπτυξης και β) την αντοχή των οστών και του φτερώματος των πτηνών (ιδανικό για γαλοπούλες και θηραματικά πτηνά).
- Κουνέλια** – βελτιώνει: α) την υγεία και β) τη γονιμότητα των κονικλομητέρων.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Αποτελείται από απαραίτητα ωμέγα-3 ποικιλούχα λιπαρά οξέα αντιοξειδωτικά, σε φορέα βασισμένο σε μεταβιτικά στοιχεία για την καλύτερη ενσωμάτωση του στις ζωοτροφές.

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

έλαιο	50%
τέφρα	45%
ΠΕ χοίρων	19,4 MJ/kg
ΜΕ πτηνών	19,4 MJ/kg
ΜΕ μηρυκαστικών	17,9 MJ/kg

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ

C20:5	εικοσαπεντενοϊκό οξύ (EPA)	ω-3	4,5%
C22:5	κλιπανοδονικό οξύ (DPA)	ω-3	1,5%
C22:6	εικοσιδυεξενοϊκό οξύ (DHA)	ω-3	5,5%

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Αγελάδες Γαλακτοπαραγωγής: Χορηγήστε μέχρι και 160 γραμμάρια/αγελάδα/ημέρα 21 ημέρες πριν τον τοκετό και τις πρώτες 100 ημέρες της γαλακτοπαραγωγής.

Μικρά Μηρυκαστικά: α) 15 γραμμάρια/αρσενικό ζώο/ημέρα για 3 εβδομάδες πριν την επίβαση και β) 15 γραμμάρια/θηλυκό ζώο/ημέρα για 6 εβδομάδες πριν τον τοκετό και 4 εβδομάδες μετά τον τοκετό.

Χοιρομητέρες/Κάπροι: 10 - 20 κιλά/τόνο σιτηρεσίου.

Χοίροι (προπάχυνση - πάχυνση): 10 κιλά/τόνο σιτηρεσίου.

Πτηνά: α) 10 - 20 κιλά/τόνο σιτηρεσίου στα ορνίθια αναπαραγωγής και γαλοπούλες β) 10 κιλά/τόνο σιτηρεσίου μέχρι την ηλικία των 30 ημερών στα κρεοπαραγωγά ορνίθια γ) 10 - 30 κιλά/τόνο σιτηρεσίου στις ωοτόκες όρνιθες.

Κουνέλια: 5 κιλά/τόνο σιτηρεσίου κονικλομητέρων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σάκοι των 25 κιλών σε στερεή κοκκώδη μορφή.



Εισάγεται και διανέμεται στην Ελλάδα από την:

MEDICAL PRODUCTS LTD
Animal Health Division

Γ. Γεννηματά 54 - 165 62 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 96 47 500 - Fax: 210 96 50 500
e-mail: ahd@mediprod.gr - web: www.mediprod.gr

Κωδικός Έγκρισης Υ.Α.Α. & Τ.: αΕL0200004 από 22/05/2006



Optomega 50

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ:

(10.4.6) Ιχθύελαιο Σολωμού

Πρόσθετη Υλή

Αντιοξειδωτικά: Γαλλικό προπύλιο

(E310) 240 mg/kg

Βουτυλ-αϋδροξυανισόλη

(E320) 720 mg/kg

Συντηρητικά:

Κιπρικό οξύ

(E330) 240 mg/kg

Προπιονικό ασβέστιο

(E282)

Συνδετικά, αντιπηκτικά και θρομβωτικά μέσα (έκδοχο):

Σεπιόλιθος

(E562) 225000 mg/kg

Πυρητικό οξύ μετά από καθίσηση και ξήρανση

(E551a)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Ελαιο (B) 50%

Τέφρα 45%

ΧΡΗΣΗ:

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής: Ταΐστε έως 160 γρ./αγελάδα/ημέρα, 21 ημέρες πριν τον τοκετό και τις πρώτες 100 ημέρες της γαλουχίας

Βοοειδή κρεοταραγωγικής κατεύθυνσης: Ταΐστε έως 160 γρ./ζών/ημέρα

Χοίροι: Έως 20 κιλά/τόνο ζωατροφής

Δοτόκες όρνιθες: Έως 30 κιλά/τόνο ζωατροφής

Πτηνά αναταραγωγής, ορνιθιά κρεοταραγωγής & γαλοπούλες: Έως 20 κιλά/τόνο ζωατροφής

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 25 kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΣΤΗΝ ΑΠΙΘΑΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Η ANPARIO ΚΑΙ Η MEDICAL PRODUCTS LTD

- * Αποθηκεύεται σε ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο στην αρχική συσκευασία
- * Χρησιμοποιείστε όλο το προϊόν της συσκευασίας μετά το άνοιγμα της, όταν αυτό είναι δυνατόν
- * Για τις μερικώς χρησιμοποιημένες συσκευασίες, αφαιρέστε όλο τον αέρα, κλείστε καλά τις συσκευασίες και χρησιμοποιείστε το υπόλοιπο προϊόν εντός 4 ημερών μετά το άνοιγμα
- * Τα κατετραμμένα σακιά πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως ή να απορρίπτονται με ασφάλεια με αποτέφρωση
- * Απόδειμα με πέρασμένη ημερομηνία λήξης πρέπει να απορρίπτεται γρήγορα και με ασφάλεια
- * Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε περιοχή μακριά από καύσιμα/εύφλεκτα υλικά